



NATIONWIDE CHILDREN'S
When your child needs a hospital, everything matters.

Helping Hand™

Health Education for Patients and Families

داء فون ويلبيراند (VWD)

Von Willebrand Disease (VWD) (Arabic)

داء فون ويلبيراند (VWD) هو اضطراب نزفي طوال الحياة ينتقل من الوالدين (بالوراثة) عبر الجينات. وفي حالة الإصابة بداء فون ويلبيراند، يستمر النزيف لفترة أطول من المعتاد لأنه من الصعب تجلط الدم. ولا يوجد علاج لداء فون ويلبيراند، ولكن هناك علاجات لبعض الأعراض.

أعلامات والأعراض

- نزيف الأنف الذي يحدث بشكل متكرر وقد يكون من الصعب إيقافه.
- نزيف اللثة بسبب تنظيف الأسنان بالفرشاة أو استخدام خيط تنظيف الأسنان.
- النزيف الناجم عن الإصابات أو الحقن (الإبر) أو الإجراءات الجراحية.
- غزارة الدورة الشهرية (الحيض).
- وجود دم في البول أو البراز. وهذا الأمر نادر الحدوث.

التشخيص

لتشخيص داء فون ويلبيراند ((VWD)، قد يخضع طفلك لما يلي:

- فحوصات الدم.
- إجراء اختبار فون ويلبيراند لمعرفة نوع داء فون ويلبيراند الذي يعاني منه.
- الحاجة لإعادة إجراء الفحص مرة أخرى في حال الإصابة بداء فون ويلبيراند الخفيف أو المتوسط.

أنواع داء فون ويلبيراند

- النوع الأول - الجسم يفرز بروتين فون ويلبيراند بصورة طبيعية، ولكن ليس بما يكفي.
- النوع الثاني - الجسم يفرز بروتين فون ويلبيراند ولكنه لا يعمل بشكل صحيح.
- النوع الثالث - الجسم لا يفرز بروتين فون ويلبيراند.

العلاج

يعتمد العلاج على الأعراض التي يعاني منها طفلك ونوع داء قون ويلبيراند الذي يعاني منه. وقد يوصف له:

- ديزموبريسين (DDAVP®) - بخاخ أنفي يزيد من معدلات بروتين قون ويلبيراند والعامل الثامن (8) للمساعدة في وقف النزيف.
- Humate-P® و VONVENDI® - عاملان مختلفان لتخثر الدم لعلاج النزيف الزائد في حالات الطوارئ أو قبل الجراحة. ويُعطى عن طريق الوريد من خلال الحقن الوريدي (IV).
- حمض الأمينوكابروييك (Amicar®) وحمض الترانيكساميك (Lysteda®) - يعمل هذا الدواء على إبطاء النزيف، ليمنع تحلل الجلطات الدموية في المنطقة المصابة.

السلامة

- لا تعطي لطفلك الأسبرين أو الإيبوبروفين (Motrin®) أو Advil®، أو نابروكسين (Aleve®) أو Naprosyn®. فقد تؤدي هذه الأدوية إلى تفاقم النزيف.
- يمكنك فقط إعطاء أسيتامينوفين (Tylenol®) أو ميلوكسيكام (Mobic®) أو سيليكوكسيب (Celebrex®) لتسكين الألم أو الحمى.
- يجب التحقق من الملصق الموجود على أدوية البرد والإنفلونزا وأدوية الألم المتاحة دون وصفة طبية. فقد تحتوي هذه الأدوية على الأسبرين أو الإيبوبروفين.
- ينبغي إخبار طبيب طفلك، أو مقدم الرعاية الصحية، أو طبيب الدم (أخصائي أمراض الدم) إذا كان يستخدم العلاجات العشبية أو الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.
- يُرجى الاتصال بمركز الهيموفيليا (النزف الدموي) إذا كان طفلك بحاجة إلى إجراء جراحة أو علاج أسنان.
- يجب أن يحصل طفلك على اللقاحات التي يوصي بها الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية.
- يُرجى استشارة اختصاصي أمراض الدم الخاص بطفلك قبل أن يبدأ ممارسة أي رياضة أو أنشطة مكثفة.
- اطلبوا من الطفل ارتداء بطاقة هوية طبية (ID). ويمكن أن تكون عبارة عن سوار أو قلادة أو رباط رياضي. حيث إن ذلك يتيح للآخرين معرفة حالته المرضية في حالات الطوارئ.

متى يجب الاتصال بالطبيب

يُرجى الاتصال بطبيب طفلك أو مقدم الرعاية الصحية أو أخصائي أمراض الدم في حال:

- تعرضه لضربة قوية على رأسه أو رقبتة.
- نزيف الأنف لمدة تستمر لأكثر من 15 دقيقة أو حدوثه بشكل متكرر.
- إذا كانت الجروح الصغيرة تنزف لأكثر من 15 دقيقة أو لا يمكن السيطرة عليها.

- الدورة الشهرية (فترة الحيض) التي تكون أكثر غزارة من المعتاد أو تستمر لأكثر من 7 أيام، أو إذا كانت تكون تجلطات بأحجام كبيرة.
- النزيف من الفم أو الشفتين أو اللثة الذي يستمر لأكثر من 15 دقيقة بعد الضغط عليها ووضع الثلج.
- وجود دم في البول أو البراز.
- ضرورة تحديد موعد لإجراء عملية أو جراحة أو علاجات للأسنان.
- المعاناة من أي آثار جانبية لا تتحسن.
- علامات أو أعراض نقص الحديد مثل الصداع أو شحوب الجلد أو الدوخة (الدوار) أو اشتهاؤ أطعمة غير معتادة مثل رقائق الثلج أو الصلصال.
- تورم المفاصل أو المعاناة من ألم بها أو سخونتها أو تيبسها.
- ألم شديد في الظهر.
- تكون نتوء بارز تحت الجلد.

معلومات أخرى

- يجب إخبار أي شخص يرعى الطفل أنه مصاب بداء فون ويلبيراند (VWD) وما العلامات التي يجب مراقبتها. ويشمل ذلك أفراد العائلة وجليسات الأطفال والمدربين والعاملين في المدرسة.
- يجب أن يراجع طفلك طبيب أمراض الدم كل عام.
- يُرجى الاتصال بطبيب طفلك أو مقدم الرعاية الصحية أو أخصائي أمراض الدم للاستفسار بشأن أي أسئلة.