

Reparación del labio leporino Cleft Lip Repair (Spanish)

El labio leporino de su bebé (Imagen 1) ha sido reparado (Imagen 2). Hay algunas cosas que debe saber sobre sus cuidados en casa. Además de estas instrucciones especiales, debe cuidar al bebé de igual forma que cualquier otro bebé de la misma edad.

Cuidado de la incisión

- La zona de la incisión (corte) tendrá un poco de enrojecimiento e hinchazón durante unas 2 semanas. Se aplica adhesivo quirúrgico sobre la incisión. Se comenzará a ver como una costra. Se debería caer en 2 semanas. Intente no mojarla.
- Es posible que vea coágulos de sangre en las fosas nasales. No los retire durante 2 semanas. Puede arrancar accidentalmente los puntos si intenta retirar los coágulos.
- Las suturas se absorberán mientras cicatriza la incisión.
- No es necesario que aplique una pomada antibiótica u otra crema. Estos pueden causar problemas con el pegamento quirúrgico.
- De 3 a 4 semanas después de la intervención, el médico de su hijo puede recomendarle un masaje diario de la cicatriz del labio con aceite de vitamina E. Esto ayuda a suavizar y aplanar la cicatriz. Esto ayuda a aplanar y suavizar la cicatriz.




Imagen 1 Labio leporino




Imagen 2 Reparación del labio leporino

Alimentación

- El bebé debería ser capaz de beber y comer igual que antes de la cirugía.
- El labio superior puede estar dolorido durante unos días y su bebé puede mostrarse inquieto a la hora de comer. Puede ayudar administrarle el analgésico prescrito aproximadamente 1 hora antes de darle de comer.
- Su hijo puede utilizar un chupete o un vaso para sorber de boquilla blanda después de la intervención.
- Después de cada comida, dele al bebé 1/2 onza de agua para limpiar su boca.

Cómo dormir

Durante la cicatrización de la incisión, el bebé debe dormir bocarriba para que no roce el labio superior con la cama.

Entablillados de brazo

Se utilizan inmovilizadores de brazo para evitar que el bebé se dañe el labio de forma accidental. Su cirujano puede recomendarle que los utilice hasta la revisión de su bebé 3 semanas después de la operación. Asegúrese de aprender a colocar los inmovilizadores antes de irse a casa. El personal de enfermería puede mostrarle cómo hacerlo.

Dolor

Es normal que experimente dolor después de irse a casa. Siga los consejos del médico para la administración de analgésicos.

Consejos de seguridad relacionados con medicamentos

El médico recetará analgésicos para administrarlos en el hogar.

- Lea la etiqueta cada vez que vaya a darle un medicamento al niño.
- Administre la cantidad exacta de medicamento que le haya recetado el médico.
- Si el medicamento es un líquido, use un dispositivo pediátrico de medición (disponible en la farmacia) para medir la dosis exacta. **Nunca mida los medicamentos líquidos con una cuchara de cocina.**
- Permanezca con su hijo hasta que haya ingerido la dosis del medicamento.
- Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.

Cuándo llamar al médico

Llame al médico de su hijo, al profesional médico o a la línea de ayuda del Centro de Labio Leporino y Paladar Hendido si su hijo tiene:

- Fiebre superior a 101° Fahrenheit (F) o 38.3° Celsius (C) por vía rectal, axilar (bajo el brazo) o en el oído.
- Aumento del enrojecimiento o la hinchazón (o ambos) a lo largo de la incisión.
- Protuberancias amarillas o blancas (granos) a lo largo de la incisión.
- Nuevas aberturas o huecos en la incisión.
- Sangrado o heridas en la incisión.
- Dolor que no desaparece al administrar analgésicos.
- Dificultad para beber o comer.
- Pañal seco durante 8 horas o más.

Si su hijo ha tomado demasiado medicamento o el medicamento equivocado, llame primero al **Centro de Intoxicaciones de Ohio Central al (800) 222-1222,** TTY (866) 688-0088. Ellos le dirán qué hacer.

Línea de ayuda del Centro de Labio Leporino y Paladar Hendido

Llame al (614) 722-6299 en horario laboral, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a viernes. Fuera de horario, fines de semana o festivos, llame al (614) 722-2000 y pida hablar con el cirujano plástico de guardia.

Cita de seguimiento

Su hijo volverá al Centro de Labio Leporino y Paladar Hendido entre 2 y 3 semanas después de la intervención. Para citas de seguimiento en el Centro de Labio Leporino y Paladar Hendido llame al (614) 722-6537.

Si tiene alguna pregunta, asegúrese de llamar a su médico o al operador del hospital al (614) 722-2000 y pregunte por el cirujano de guardia.

Cuidados postoperatorios en equipo

El Centro de Labio Leporino y Paladar Hendido del Nationwide Children's Hospital atiende a pacientes con labio leporino y/o paladar hendido y afecciones craneofaciales relacionadas. Creemos que la atención en equipo es la mejor atención. Nuestro equipo incluye:

- Enfermeros
- Ortodoncistas
- Especialistas en alimentación
- Dentistas
- Audiólogos
- Enfermeros practicantes
- Genetistas
- Psicólogos
- Otorrinolaringólogos
- Trabajadores sociales
- Cirujanos plásticos
- Logopedas

Este equipo trabaja en estrecha colaboración para elaborar un plan de cuidados personal para su hijo que funcione a medida que crece. Creemos que empezar pronto la atención en equipo es la mejor manera de apoyar el desarrollo de su hijo.

Puede esperar que la primera visita de su hijo al equipo comience entre los 15 y los 18 meses de edad. Llame al (614) 722-6537 o envíenos un mensaje a través de MyChart® para programar la primera visita de equipo de su hijo.