




## Reparación del labio leporino Cleft Lip Repair (Spanish)


El labio leporino de su bebé (Figura 1) se reparó (Figura 2). Hay algunas cosas que debe saber sobre su cuidado en el hogar. Además de estas instrucciones especiales, debe cuidar al bebé de igual forma que cualquier otro bebé de la misma edad.

### Cuidados de la incisión

- El área de la incisión presentará un poco de enrojecimiento e hinchazón por aproximadamente 2 semanas. Se aplica adhesivo quirúrgico sobre la incisión. Se comenzará a ver como una costra, que se debería caer en 2 semanas. Intente no mojarla.
- Podría haber coágulos de sangre en las fosas nasales; no los saque por 2 semanas. Puede tirar de los puntos de forma accidental si intenta sacar los coágulos.
- Las suturas se absorberán mientras cicatriza la incisión.
- No necesita aplicar ungüento antibiótico ni ninguna otra crema. Estos pueden causar problemas con el pegamento quirúrgico.
- El médico del niño recomienda masajear todos los días el labio con aceite de vitamina E después de tres a cuatro semanas de la cirugía. Esto ayuda a aplanar y suavizar la cicatriz.



**Figura 1** Labio leporino



**Figura 2** Reparación del labio leporino

## **Alimentación**

- El bebé debería ser capaz de beber y comer igual que antes de la cirugía.
- El labio superior podría doler por varios días y el bebé puede estar quisquilloso al momento de la alimentación. Algo que puede ayudar es administrar el analgésico casi una hora antes de la alimentación.
- El niño puede utilizar un chupete o un vaso con regulador de líquido con boquilla suave después de la cirugía.
- Después de cada comida, dele al bebé 1/2 onza de agua para limpiar su boca.

## **Cómo dormir**

Durante la cicatrización de la incisión, el bebé debe dormir bocarriba para que no roce el labio superior con la cama.

## **Inmovilizadores de brazo**

Se utilizan inmovilizadores de brazo para evitar que el bebé se dañe el labio de forma accidental. Es posible que el cirujano le recomiende usarlos hasta la revisión de su bebé 3 semanas después de la cirugía. Asegúrese de aprender a colocar los inmovilizadores antes de irse a casa. El personal de enfermería puede mostrarle cómo hacerlo.

## **Dolor**

Es normal que experimente dolor después de irse a casa. Siga los consejos del médico sobre la administración de analgésicos.

## **Consejos de seguridad sobre los medicamentos**

El médico recetará analgésicos para administrarlos en el hogar.

- Lea la etiqueta cada vez que vaya a darle un medicamento al niño.
- Administre la cantidad exacta de medicamento según las instrucciones del médico.
- Si el medicamento es un líquido, use un dispositivo pediátrico de medición (disponible en la farmacia) para medir la dosis exacta. No mida los medicamentos líquidos con cucharas de cocina.
- Permanezca junto a su hijo hasta que se haya tragado la dosis del medicamento.
- Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

## **Cuándo llamar a su proveedor de servicios de atención médica**

Llame al proveedor de servicios de atención médica de su hijo o a la línea de ayuda del Cleft Lip and Palate Center (Centro de Labio Leporino y Paladar Hendido) si su hijo presenta:

- Fiebre superior a 101°F o 38.3°C cuando se toma de forma rectal, axilar (debajo del brazo) o en el oído.
- Un aumento del enrojecimiento o hinchazón (o ambos) en el lugar de la incisión.
- Aparición de bultos blancos o amarillentos (espinillas) junto a la incisión.
- Nuevas aberturas o huecos en la incisión.
- Sangrado o lesión en la incisión.
- Dolor que no se detiene luego de administrar analgésicos.
- Problemas para beber o comer.
- Problemas para orinar durante 8 horas o más

**Si el niño ha tomado demasiado medicamento o el medicamento equivocado,** primero llame al **Central Ohio Poison Center al 800-222-1222**, TTY 866-688-0088. Ellos le dirán qué hacer.

## **Línea de ayuda del Cleft Lip and Palate Center:**

Durante el horario normal de atención, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. de lunes a viernes, llame al 614-722-6299. Fuera de horario, los fines de semana o feriados, llame al 614-722-2000 y solicite hablar con el cirujano plástico de turno.

## **Cita de seguimiento**

El niño volverá al Cleft Lip and Palate Center de 2 a 3 semanas después de la cirugía. Para organizar citas de seguimiento en el Cleft Lip and Palate Center, llame al 614-722-6537.

Si tiene alguna pregunta, asegúrese de llamar a su médico o al operador del hospital al 614-722-2000 y solicite hablar con el cirujano de turno por el médico de su hijo.