



NATIONWIDE CHILDREN'S
When your child needs a hospital, everything matters.™

Helping Hand™

Health Education for Patients and Families

ब्रोन्कियोलाइटिस Bronchiolitis (Nepali)

ब्रोन्कियोलाइटिस (bron-key-oh-LIE-tiss) सामान्यतया RSV (रेस्पिरटरी सिन्सिटियल भाइरस) भाइरसको कारणलाहुन सक्ने प्रणालीको संक्रमण हो। यसलाई निम्त्याउन सक्ने अन्य भाइरसहरू मारुघाखोकी, साधारण रुघाह्युमन मेटाब्युमो भाइरस र एडसो भाइरस छन्। यी भाइरसहरू धेरै संक्रामक छन्। व्यक्तिगत संक्रमित व्यक्तिको नक्क वामुखबाट मिस्ट, निकास (सङ्क), म्यूकस वल्लमछोएर वसस फर्दा भाइरस समाउँछ।

ब्रोन्कियोलाइटिस सानो श्वसनली (ब्रोन्कियोल) मा हुन्छ जुन ठूलो श्वसनली (ब्रोन्ची) बाट अलग हुन्छ (चित्र 1)। ब्रोन्कियोलहरू सुन्निन्छन्, साँझुरो हुन्छन् र बलगमलाभरिन्छन्, जसलेसास फर्छ गह्रो बनाउँछ।


ब्रोन्कियोलाइटिस प्रायः 2 वर्ष मुनिको बालबालिकामा शरद र जाडोमा देखिन्छ। बच्चा यसलाई प्रत्येक मौसममा एक पटक भन्दा बढी प्राप्त गर्न सक्छ।

प्रारम्भिक सङ्केतहरू

- नक्क बग्ने नक्क बन्द हुन
- ज्वरो
- हल्का खोकी लाग्न
- दिक्क मज्जु

पछि सङ्केतहरू

- छिटो र गहिरो सास फर्छ
- 15 देखि 20 सङ्क वल्लामो समयसम्म सास फर्छ रोकिन्छ (एप्रिय)



चित्र 1 शरीरभित्र श्वसन प्रणाली।

- सास फर्मे बलामा छलामा रिब्स र घाँटीको बिचमा तानिन्छ (रिट्र्याक्सन)
- छलामाको रङमा परिवर्तन - फिक्का छलामा औँलमा खुट्टाको नङ, नाक वमोठसम्म नीलो रङ
- टाउको बबिड
- बलामा खोकी लगभग 3 देखि 4 हप्तासम्म रहन्छ
- घुरघुर श्वास हुनासास फर्मे गएको हुनामा 2 देखि 3 दिनसम्म खराब हुन्छ, त्यसपछि राम्रो हुन थाल्छ। घुरघुर श्वास 7 दिन सम्म रहन्छ।)
- खलामा रुचि कम हुनामा
- चञ्चल नहुनासास जिलै थकित हुनामा


निदान

तपाईंको बच्चाको स्वास्थ्य सबप्रदायकला

- स्वास्थ्य इतिहास लिनु हुनाछ, परीक्षण गर्नु हुनाछ र उनीहरूको छाती सुन्नु हुनाछ।
- भाइरसको जाँच गर्न नाकको भित्री भागमा स्वाब गर्न सक्नु हुनाछ।

तपाईंको बच्चाधैरि बिरामी छ भनास्वास्थ्य सबप्रदायकला

- पल्स अक्सिमिटरकासास उनीहरूको रगत अक्सिजन स्तर जाँच गर्नु हुनामा छ। यो पीडाहित सप्तर हो जुन बच्चाको औँलामा खुट्टामा राखिन्छ।
- रगत परीक्षण र छातीको एक्स-रेअर्डर गर्नु हुनामा




चित्र 2 पहिलसलइन ड्रपहरू प्रयोग गर्नुहोस् र त्यसपछि NoseFrida® वा बबो बल्ब सिरिन्ज म्यूकस चुस्नुहोस्।

घरेलु उपचार

भाइरसलाओन्कियोलाइटिस निम्त्याउनभएकोलाएन्टिबायोटिक औषधिलफाइदागर्दैन। यहाँ तपाईंलाआफ्नो बच्चालाई थप सहज बनाउन गर्न सक्नाकाही चीजहरू छन्:

- खोकी र श्लेष्म निर्माण (भीड) काटलागि, एक चिसो मिस्ट भाष प्रयोग गर्नुहोस्। चिसो हावालासास फर्मे सजिलो बनाउन र खोकी कम गर्न सक्छ। वापोरइजरमाऔषधि नराख्नुहोस्। यसको पानी हरक दिन परिवर्तन गर्नुहोस् र प्रयोगहरू बिच सफागर्नुहोस्।
- बन्द भएको नाककाटलागि, नुन पानी (नमकीन) नाक थोपाम्यूकस खुकुलो गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसपछि NoseFrida® वाबबो बल्ब सिरिन्ज (चित्र 2) जस्तोसक्शन यन्त्रलाम्यूकस चुस्नुहोस्।
- ज्वरोकाटलागि, बच्चाहरूलाई निम्न दिनुहोस्:

- 2 महिनभन्दबढी, एसिटमिनोफन (बालबालिकव शिशुको Tylenol®)
- 6 महिनभन्दबढी, एसिटमिनोफन वआइबुप्रोफन (बालबालिकवशिशुको Motrin®, Advil®)
- कुनै पनि बच्चालाई एसिपरिन वएसिपरिन भएको उत्पादनहरू नदिनुहोस् (चित्र 3)।
- 4 वर्ष मुनिकबालबालिकलाई रुघाखोकी लाग्नाऔषधि नदिनुहोस्।
- एक वर्षभन्दकम उमरकबालबालिकलाई मह नदिनुहोस्।



चित्र 3 एसिपरिन नदिनुहोस्। आफ्नो बच्चाको उमरअनुसार सही खुराक थाक् पछिन दिनुअघि कुनै पनि औषधिको लबल पढनुहोस्।

- धेरै तरल पदार्थहरू दिनुहोस् – एक पटक र अक्सर थोरै मात्रा यो फर्मुलवस्तन दूधसँग पनि गर्नुहोस्।
 - 12 महिनमुनिकबच्चालाई फलफूलको जुस वपानी नदिनुहोस्। पहिलास्वास्थ्य सब प्रदाकलाई नसोधिकन Pedialyte® नदिनुहोस्।
 - **12 महिना भन्दा पुराना** बालबालिककालागि, Pedialyte® र पानी जस्तै तरल पदार्थ दिनुहोस्। यसलाइ पनि आफ्नो सामान्य खानाखानाआवश्यकतालाई प्रतिस्थापन गर्दै न। फलफूलको जुस वचिनीको मात्राबढी हुनतरल पदार्थलाई सीमित गर्नुहोस्।
- डिजिटल, थर्मोमिटरको प्रयोग गरर आफ्नो बच्चाको तपक्रम जाँच गर्नुहोस्। **पारा थर्मोमिटरको कहिल्यै प्रयोग नगर्नुहोस्।**
 - रक्कल (बच्चाको तल्लो भागमा) थर्मोमिटरहरू सबैभन्दसही हुन्छन्। अर्को उत्तम विकल्प निधार (टम्पोरल धमनी) थर्मोमिटर हो। एक एक्सिलरी (काखी) तपक्रम छिटो जाँच गर्नेको रूपमप्रयोग गर्न सकिन्छ तर यो धेरै सही हुँदैन। तपाईंको बच्चा 4 वर्षको नभएसम्म मौखिक थर्मोमिटर प्रयोग नगर्नुहोस्।
 - तपाईंको बच्चाको उमरमाआधरित थर्मोमिटर छनोट गर्नुहोस्:
 - 3 महिनभन्दकम उमरक रक्कल वफोरहड थर्मोमिटरहरू
 - 4 महिनवसोभन्दबढी उमरक रक्कल, फोरहड वएक्सिलरी थर्मोमिटरहरू
 - 6 महिनभन्दबढी उमरक रक्कल, फोरहड, इएर वएक्सिलरी थर्मोमिटरहरू
 - 4 वर्ष वसोभन्दबढी उमरक ओरल (मुख) फोरहड, इएर वएक्सिलरी थर्मोमिटरहरू
 - आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्य हराह प्रदाकलाई तपाईंलाकुन विधिको प्रयोग गर्नुहुन्छ भना बताउन नबर्सनुहोस्।

तपाईंको बच्चा अस्पतालमा भर्ना भएमा

तपाईंको बच्चा

- मुटुको धड्कन र अक्सिजनको स्तर हर्षकपल गि सस्तरमा जडान हुन सक्नुहुन्छ।
- अक्सिजन आवश्यक हुन सक्छ। यो सामान्यतया नलको क्याथ्युलर (नलमसजो काँच भएको प्लास्टिकको ट्युबिड) वामस्क प्रयोग गरर दिइन्छ। पृष्ठ 4 मा चर्चानी हर्नुहोस्।
- तरल पदार्थ र काही पोषण दिनकपल गि IV ररर सक्नुहुन्छ। अक्सर ब्रोन्कियोलाइटिस भएको बच्चा लाई खान र पिउन गाह्रो हुन्छ।
- म्यूकस हटाउनकपल गि बल्ब सिरिन्ज, नोजफ्रीडपवसक्शन मसिनमा जोडिएको सजो ट्यूबला उनीहरूको नाक सफागर्न आवश्यक पर्न सक्छ।
- नलमभएको म्यूकसलाई सफागर्नुअघि नुन पानीको थोपला उपचार गर्नुहोस्।
- उनीहरू 3 महिनाभन्दकम उमरकपछन्, गम्भीर संक्रमण छ वपहृदय वपफोक्सोको रोगको इतिहास छ भनविशेष उपचार चाहिन्छ।

चेतावनी

- मडिकल डिभाइस ट्युबिड बच्चाको घाँटीको वरिपरि बरिन सक्छन्। यसलाश्वासवरोध (श्वास रोक्किना)वपमृत्यु हुन सक्छ।
- शिशु वपबालबालिकहरू अल्लिन सक्नासम्भानभएको लामडिकल डिभाइस ट्युबिडलाई त्यत्तिकै नछाड्नुहोस्।
- आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकसँग कुरागर्नुहोस्:
 - तपाईंको बच्चापहिलपट्युबिडमअल्लिएको छ भना
 - ट्युबिडलाई सम्भव भएसम्म आफ्नो बच्चाबाट टाढाररर बच्चाको घाँटीको वरिपरि ट्युबिड बरिँदैन भनी सुनिश्चित तपाईंलामहतकपल गि चान्न सक्नाकदमहरू सिक्न।
 - मडिकल डिभाइस ट्युबिडबाट घाँटी थिच्नाजोखिमको बरसातपाईंलाई हुन सक्नाअन्य कुनै चिन्ताहरू।
- तपाईंको बच्चा लाई मडिकल डिभाइस ट्युबिडलाओट लाएको छ भनाकृपयाFDA लाई घटनको रिपोर्ट दिनुहोस्। तपाईंलारिपोर्ट गर्नुभयो भनबिरामीको सुरक्षालाई सुधार्न मदत गर्न जलकरी प्राप्त हुन सक्छ। रिपोर्ट गर्न निम्न वबसाइट छ:
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/index.cfm?action=reporting_home

रोकथाम

अरूलाई भाइरस फैलिनबाट रोक्न:

- आफ्नो बच्चालाई छुनु र खाजाप्याजल गर्नुअघि आफ्नो हात बरम्बर धुनुहोस्। हातछुँ गदा खोक्दा बथरूम प्रयोग गरएछि वण्डापर बदलएछि हात धुनुहोस्। अरूलाई पनि त्यसै गर्न सोध्नुहोस्।
- टिश्युमपत्रआफ्नो सर्तको बकुलामा हातछुँ गर्नुहोस् वखोक्नुहोस्, मानिसहरूबाट टाढा हुनुहोस्।
- प्यासिफायर, तौलियटूथब्रस, पिउनगिलास, कप, बोतल, काँटावचम्वजस्तव्यक्तिगत वस्तुहरू साझा नगर्नुहोस्।
- आफ्नो बच्चाको खाना नलुगावर्बरम्बर धुनुहोस्।
- चिसो लगाकामानिसहरूलाई आफ्नो बच्चाबाट टाढारख्नुहोस्। यसमदजुभाई र दिदीबहिनीहरू समझ्छन्।
- आफ्नो बच्चाको वरिपरि धुम्रपात्र नगर्नुहोस् वअरूलाई उनीहरूको वरिपरि धुम्रपात्र गर्न नदिनुहोस्।
- तपाईंको बच्चाबिरामी हुँदास्कूल वबाल स्याङ्गबाट घरमोरख्नुहोस्।

तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदातालाई कहिले फोन गर्नु

तपाईंको बच्चाई निम्न भए तपाईंको बच्चाको स्वास्थ्य सबप्रदायकलाई बोलाउनुहोस्:

- अस्पतालबाट घर गएपछि झन् खराब हुन्छ वघरघरकट गर्न थच्छ।
- बिरामी परको 2 दिन बितिसक्दापनि खाजा सकको छैन।
- एपनियछ, सास फर्कन समस्याछ वधै छिटो सास फर्छ।
- फिक्कवछला औलहरू, खुट्टा औलहरू वओठ नीलो देखिन्छ।
- सास फर्काइरिद्वसन हुन्छ।
- सुत्न सक्नुहुन्न।
- ज्वरो छ:
 - 3 महिनभन्दाकम उमरको हो र 100.4°F (38°C) वसोभन्दाभतिको तपक्रम।
 - 3 महिनभन्दाभतिको र उनलाई निम्न तपक्रम छ:
 - 104°F (40°C) वसोभन्दाभतिको।
 - 102°F (38.9°C) भन्दाभति 2 दिन भन्दाबढि वफर्किनक्रम जरी छ।
 - यसलाई तल ल्याउनकालागि उपचार गरिएको छ तर यसलक्रम गरको छैन।

- जुनसुकै उमरमा ज्वरो आउनरः
 - धेरै बिरामी देखिन्छ, धेरै चकचकछ वधेरै सुस्त छ।
 - खाजाको पिउनको छैन र डिहाइड्रेसनको लक्षणहरू देख्दाँछ सुखको वचिपचिपको मुख, भाँसिएको आँखो गाढोपिसा, सुखको डोपेर वपिसा नगरको।
 - घाँटी कडो हुनको दुखो धेरै घाँटी दुखोपत दुखोवत हुनको पखालोला।
 - असमय दगाहरू हुन।
 - धेरै तलो ठोँमो भएको, जस्तै अति तलो भएको क।
 - प्रतिरक्षोणलीमोसमस्या छ जसलो बिमारी हुनअधिक सम्भवनोबढ्दाँछ जसलो सिकल सल रोग वक्यसर वप्रतिरक्षोणलीलाई कमजोर गरउनओषधि खन्छ।
- राखिएको वखुवदोसत्वनोदिन सकिँदैन।

तपाईंको बच्चालाई सास फेर्न समस्या छ, चोट लागेको छ वा उठ्न गाह्रो भएको छ भने 911 मा फोन गर्नुहोस् वा आपतकालीन विभागमा जानुहोस्।