

सिडेसन वा एनेस्थेसियाको साथ श्रवण मस्तिष्क प्रतिक्रिया (एबीआर)

Auditory Brainstem Response (ABR) with Sedation or Anesthesia (Nepali)

श्रवण मस्तिष्क प्रतिक्रिया (ABR) एउटा परीक्षण हो जसले श्रवण हराउनेको जाँच गर्दछ। ABRs हरूले श्रवण तन्त्रिकाबाट ब्रेनस्टेममा आवाज कति राम्रोसँग सँधे भनेर हेर्छन्। ती सामान्यतया शिशुहरू तथा बालकहरूमा गरिन्छ जसले उनीहरूको उमेर वा विकासको स्तरका कारण अन्य श्रवण परीक्षणहरू गर्न सक्दैनन्।

परीक्षणको बारेमा

इलेक्ट्रोड भनिने साना स्टिकरहरू प्रत्येक कानको पछाडि वा अगाडि र निधारमा लगाइन्छ। त्यसपछि, आवाजहरू पठाउन (प्रसारण) गर्न तपाईंको बालकको कानमा विशेष इयरफोनहरू लगाइन्छ। इलेक्ट्रोडहरूले तपाईंको बच्चाको सुन्न सक्ने कुराहरू रेकर्ड गर्दछ। यो परीक्षण सुरक्षित छ। यसले तपाईंको बालकलाई चोट पुऱ्याउने छैन।

परीक्षणभन्दा अघि

- एकजना नर्सले तपाईंलाई मिति र समय तय गर्न परीक्षणको लगभग 1 देखि 2 दिनअघि सम्पर्क गर्नेछ। उनीहरूले तपाईंलाई परीक्षणअघि तपाईंको बालकले के खान वा पिउन सक्छ भनेर पनि बताउनेछन्।
- यदि तपाईंको बालकले औषधि लिन्छ भने, नर्सले तपाईंलाई परीक्षण अघि कुन औषधिहरू लिनु हुँदैन भनेर बताउनेछिन्।
- आफ्नो बालकको परीक्षणअघि खाना, पेय पदार्थ र औषधिहरूको बारेमा दिइएका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। यदि तपाईं यी निर्देशनहरू पालना गर्नुभएन भने, परीक्षण रद्द हुन सक्छ।
- यदि तपाईंका प्रश्नहरू छन् भने, पूर्व-प्रवेश/सेडेसन नर्सहरूलाई:
 - कोलम्बस: (614) 722-3850
 - तोलेदो: (419) 251-4630 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

सेडेसनका प्रकारहरू

- तपाईंको बालकको निम्न कुराहरू हुने निर्धारित गरिएको छ:
 - ☐ हल्का सेडेसन
 - ☐ एनेस्थेसिया
- **हल्का सेडेसन** हल्का निन्द्रा हो। जब तपाईंको बच्चालाई हल्का सेडेसन गरिन्छ, उनीहरूलाई के भइरहेको छ भन्ने थाहा हुँदैन। तिनीहरूले आफैं सास फेर्छन् र केही कुराहरूमा प्रतिक्रिया दिन सक्छन् जस्तै बोलाउँदा वा छुँदा। **यो सेडेसन विकल्प राष्ट्रव्यापी बाल अस्पताल टोलेडोमा मात्र गरिन्छ।**
- **एनेस्थेसिया** गहिरो निन्द्रा हो। एनेस्थेसिया अन्तर्गत हुँदा, तपाईंको बालकलाई के भइरहेको छ भन्ने थाहा हुने छैन। तिनीहरूले बोलाउँदा वा छुनेजस्ता कुराहरूमा प्रतिक्रिया दिँदैनन्। **यो राष्ट्रव्यापी बाल अस्पताल कोलम्बसमा मात्र गरिन्छ।**

निम्नमध्ये कुनै पनि भएका बालकहरूलाई एनेस्थेसिया दिन आवश्यक हुन सक्छः

- जटिल चिकित्सा समस्याहरू
- स्लीप एपनियाको इतिहास
- अन्डा एलर्जी
- क्रोमोजोम असामान्यताहरू
- तिनीहरूको वायुमार्गमा समस्या
- मुटुसम्बन्धी समस्याहरू जो निको भएका छैनन्
- अस्वस्थ रूपमा मोटो (BMI 35 भन्दा बढी)
- अटिजम
- बालकहरूहरू जसले एनेस्थेसिया नगरी IV
- हिराउने वा टोक्नेजस्ता आक्रामक व्यवहार लिन सक्दैनन्

परीक्षणको दिन-हल्का सेडेसन (टोलेडो मात्र)

1. अपोइन्टमेन्टको दिन, तपाईंले युनिटमा चेक इन गर्नुहुनेछ। आफ्नो बालकको एबीआर हुनुभन्दा 90 मिनेट अघि आइपुग्नुहोस्।
2. चेक इन गरेपछि, तपाईं र आफ्नो बालक एउटा युनिटमा जानुहुनेछ। तपाईंले डाक्टरसँग कुरा गरेपछि सेडेसनका लागि अनुमति दिने सहमति फारममा हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ। तपाईं परीक्षणका लागि आफ्नो बालकसँग कोठामा बस्न सक्नुहुन्छ।
3. तपाईंको बालकलाई या त इन्ट्रावेनस (IV) लाइन दिइनेछ वा नाकमा सेडेसन औषधि लगाइनेछ। यदि IV आवश्यक छ भने तपाईंले आफ्नो बच्चाको कसरी मदत गर्न सक्नुहुन्छ भनी नर्सले व्याख्या गर्नेछ।
4. नर्स वा डाक्टरले तपाईंको बच्चाको औषधि दिनेछन् र उनीहरू सुतिरहेको देख्नेछन्। तिनीहरू सम्पूर्ण परीक्षणको समयमा तपाईंको बच्चासँग रहनेछन्।
5. श्रवण चिकित्सक (अडियोलोजिस्ट) ले परीक्षण गर्नेछन्। यसमा 30 देखि 90 मिनेटको समय लाग्नेछ। जब परीक्षण समाप्त हुन्छ, अडियोलोजिस्टले तपाईंसँग परिणामहरूबारे छलफल गर्नेछन्।
6. तपाईंका बच्चाको उनीहरू नउठेसम्म प्रक्रिया कोठामा ध्यानपूर्णक हेरिनेछ।

7. तपाईंको बच्चा निद्रावस्थाबाट जागेपछि उसले केही सफ्फा झोल पदार्थ पिउन सक्छ। यदि तिनीहरूले तरल पदार्थ कम राख्न सक्छन् भने, तिनीहरूसँग क्रयाकरहरू हुन सक्छन्। तपाईंको बच्चालाई अस्पताल नछोडेसम्म नजिकबाट निरीक्षण गरिनेछ।

परीक्षणको दिन- एनेस्थेसिया (कोलम्बस मात्र)

1. अपोइन्टमेन्टको दिन, तपाईं चेक इन गर्न दर्ता गर्न जानुहुनेछ। आफ्नो बालकको ABR हुनुभन्दा 90 मिनेट अघि आइपुग्नुहोस्।
2. दर्ता गरेपछि, तपाईं र आफ्नो बालक प्रि-अपरेटिभ (प्रि-अप) कोठामा जानुहुनेछ। तपाईंले डाक्टरसँग कुरा गरेपछि एनेस्थेसियाका लागि अनुमति दिने सहमति फारममा हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ। नर्सले तपाईंको बच्चालाई प्रक्रिया कक्षमा लैजानेछ। परीक्षाको समयमा तपाईं प्रतीक्षालयमा बस्नुहुनेछ।
3. एकजना नर्स वा डाक्टरले मास्कमार्फत एनेस्थेसिया औषधि सुरु गर्नेछन्। त्यसपछि, तिनीहरूले तपाईंको बालकलाई एनेस्थेसिया औषधि दिन जारी राख्न इन्ट्रावेनस लाइन (IV) दिनेछन्। एकजना नर्स वा डाक्टरले तपाईंको बालकलाई हेर्नेछन् अनि सम्पूर्ण परीक्षणको समयमा उनीहरूसँग रहनेछन्।
4. श्रवण चिकित्सक (अडियोलोजिस्ट) ले परीक्षण गर्नेछन्। यसमा 30 देखि 90 मिनेटको समय लाग्नेछ। जब परीक्षण समाप्त हुन्छ, तपाईंको बालकलाई पोस्ट-एनेस्थेसिया केयर युनिट (PACU) मा सारिनेछ र उनीहरू ब्युँझिने बेलासम्म नजिकबाट निरीक्षण गरिनेछ।
5. अडियोलोजिस्टले तपाईंलाई परीक्षणपछि प्रतीक्षालयमा भेट्नेछन् अनि परिणामबारे छलफल गर्नेछन्।
6. जब तपाईंको बालक ब्युँझिन्छ, तपाईं तिनीहरूलाई देख्न सक्नुहुनेछ। उसले केही सफ्फा झोल पदार्थ पिउन सक्छ। यदि तिनीहरूले तरल पदार्थ कम राख्न सक्छन् भने, तिनीहरूसँग क्रयाकरहरू हुन सक्छन्। अस्पताल नछोडेसम्म उनीहरूलाई नजिकबाट निगरानी गरिनेछ।