

Cultivo de garganta Throat Culture (Spanish)

Su hijo está siendo sometido a una prueba de cultivo de garganta debido a que muestra signos de faringitis estreptocócica. El estreptococo, o *Streptococcus*, es un germen dañino (bacteria). Si no se trata, puede perjudicar al organismo. Hay 2 tipos de pruebas que se usan para averiguar si su hijo tiene faringitis estreptocócica.

- Una prueba rápida de detección de estreptococos (prueba rápida de antígeno)
- Un cultivo de garganta

Signos y síntomas de la faringitis estreptocócica

Un niño con faringitis estreptocócica podría tener algunos de estos síntomas (o todos):

- Enrojecimiento y dolor de garganta
- Fiebre
- Manchas blancas en la parte posterior de la garganta, las amígdalas o la lengua
- Ganglios del cuello inflamados y sensibles
- Lengua roja y brillante
- Problemas para tragar
- Diminutas manchas rojas en el paladar
- Dolor de cabeza, inquietud
- Erupción roja similar al papel de lija en el cuerpo (escarlatina)
- Duerme más de lo habitual
- Dolor de estómago, falta de apetito, náuseas o vómito – en especial en niños más pequeños

Qué sucederá

Ambas pruebas utilizan el mismo tipo de hisopo blando. Su hijo inclinará la cabeza hacia atrás, abrirá la boca y dirá "ahh". El médico o proveedor de atención médica frota 1 o 2 hisopos sobre la parte posterior de la garganta. Su hijo puede hacer algunas pequeñas arcadas.

- Prueba rápida de detección de estreptococos (prueba rápida de antígeno) – La obtención de los resultados de una prueba rápida de detección de estreptococos se tarda hasta 30 minutos. Deben quedarse hasta que los reciban.
- Cultivo de garganta – Se envía un hisopo al laboratorio para su análisis. La obtención de los resultados toma de 1 a 2 días.
- Si a su hijo le hicieron primero una prueba rápida de estreptococos, se puede enviar el mismo hisopo al laboratorio para hacer el cultivo de garganta. No será necesario volver a tomarle la muestra. El laboratorio notificará al médico o proveedor de atención médica de su hijo, y él será quien les informe luego los resultados.

Resultados de la prueba

- Una **prueba** positiva significa que su hijo tiene faringitis estreptocócica.
 - El medicamento antibiótico debe iniciarse de inmediato. El tratamiento temprano puede prevenir daños al cuerpo.
 - Es importante que el médico o proveedor de atención médica de su hijo sepa cómo comunicarse con usted por teléfono.
- Una **prueba** negativa significa que el dolor de garganta puede ser causado por un virus. Los antibióticos no ayudan a tratar las infecciones virales.

Cómo puede proteger a los demás

- Mantenga a su hijo alejado de los demás tanto como sea posible durante 12 horas después de que comience a tomar un antibiótico. El estreptococo es contagioso (puede propagarse hacia otras personas).
- Todos deberían lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o usar desinfectante para manos. Lavarse bien las manos evita la propagación de la infección.
- La humedad de la nariz y la boca de su hijo es contagiosa. Haga que su hijo se cubra la boca al toser o estornudar. Deseche los pañuelos inmediatamente después de usarlos y lávese las manos.
- No compartan vasos para beber o utensilios para comer.
- Informe al enfermero de la escuela y al maestro de su hijo que este tiene faringitis estreptocócica. La escuela necesita saberlo para que puedan informar a los demás padres con el fin de que estén atentos a sus hijos en caso de que presenten síntomas.
- Si alguien en la familia tiene dolor de garganta, debería someterse a una revisión por parte de su médico o proveedor de atención médica para ver si tiene estreptococos.