

Broncoscopía y laringoscopia

Bronchoscopy and Laryngoscopy (Spanish)

La broncoscopía y la laringoscopia son 2 procedimientos que suelen realizarse al mismo tiempo. Se utiliza un telescopio especial para ver la laringe y la tráquea (tráquea y bronquios).

Su hijo puede necesitar que se lo hagan como parte del diagnóstico de un problema respiratorio, como tratamiento, para tomar pequeños trozos de tejido para analizarlos (biopsia) o para extraer un objeto atascado.

Cita de su hijo

Nombre del niño: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Traiga a su hijo a:

- ☐ Área de admisión de cirugía ambulatoria), 1ª planta, 670 Children's Drive
- ☐ Oficina de admisión del vestíbulo de la torre, 1ª planta, 700 Children's Drive
- ☐ Otro: _____

Llegue 15 minutos antes de la hora de su cita para registrarse.

Antes del procedimiento

- El enfermero le llamará para hacerle preguntas sobre la salud de su hijo.
- El enfermero le dirá cuándo debe dejar de darle comida y líquidos a su hijo, cuándo debe llegar al hospital y la hora de la intervención.
- Nada de goma de mascar, pastillas para la tos ni caramelos duros. Si su hijo ha estado masticando goma de mascar, la operación se retrasará 2 horas desde el momento en que escupa la goma de mascar. Si se ha tragado la goma de mascar, la cirugía se retrasará hasta 6 horas desde el momento en que se la tragó.

Anestesia general

Su hijo recibirá anestesia durante la intervención. Es un tipo de medicamento que le ayuda a dormir y le impide sentir dolor. Normalmente se administra a través de un catéter intravenoso (IV) o se respira a través de una mascarilla.

- El médico o el profesional de atención médica hablarán con usted sobre los medicamentos que se utilizarán.
- El tipo de medicamento que recibirá su hijo dependerá del motivo por el que se someta al procedimiento y de la duración del mismo.

Después del procedimiento

Su hijo irá a la unidad de cuidados postanestésicos (PACU) o a una sala de recuperación. Lo llevarán a su habitación después de despertarse. Su médico o profesional de atención médica hablará con usted sobre cómo ha ido la intervención. Es posible que le muestren fotografías tomadas durante la prueba.

- Después de que su hijo se despierte, podrá tomar pequeñas cantidades de líquidos claros si no tiene náuseas o vómitos. Esto incluye agua, jugo de manzana o palitos helados Popsicles®.
- Tiene que beber mucho líquido durante 24 horas. El médico o el profesional de atención médica le dirán cuándo puede tomar alimentos sólidos.
- Puede estar más cansados de lo habitual. Esto es normal.
- Su hijo puede tener la voz ronca y dolor de garganta. Puede que le den acetaminofeno (Tylenol®) para el dolor.

- Una ligera fiebre es normal. Haga que su hijo beba mucho líquido para ayudar a bajar o prevenir la fiebre.

Medicamentos para el dolor después de la intervención

El médico o el profesional de atención médica de su hijo pueden recomendarle acetaminofeno (Tylenol[®], Feverall[®] y Tempra[®]) o ibuprofeno (Motrin[®], Advil[®]).

- Dé a su hijo la cantidad exacta de medicamento que le hayan recetado.
- Si el medicamento es líquido, utilice un medidor pediátrico para medir la dosis (Imagen 2). Puede adquirirlo en una farmacia. **No mida la medicina líquida con cucharas de cocina.**
- Permanezca con su hijo hasta que haya tragado todo el medicamento.
- Si su hijo tiene un dolor intenso que no desaparece, llame a su médico o profesional de atención médica. **No le dé más medicamento.**
- No le dé más de 5 dosis de paracetamol en un período de 24 horas a menos que se lo ordene el médico o el profesional de atención médica.
- Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.
- Si a su hijo le recetan analgésicos o antibióticos, utilícelos según las indicaciones.

Si su hijo u otra persona toma demasiado medicamento, llame al Centro de Intoxicaciones de Ohio Central al **1 (800) 222-1222 [TDD (614) 228-2272]**. Ellos le dirán qué hacer.

Cuándo llamar al médico

Hable con el médico de su hijo o con el proveedor de atención médica, si:

- Empieza a respirar de forma diferente.
- Tiene cambios en el color de la piel.
- Está más cansado de lo normal.
- Tiene fiebre superior a 101° Fahrenheit (F) o 38.3° Celsius (C).
- Tiene fiebre que dura más de 24 horas después de la prueba.




Imagen 2 Utilice un medidor pediátrico cuando administre medicamentos líquidos.

- Tiene náuseas o vómitos durante más de 24 horas después de la prueba. O durante más de 12 horas si es menor de 1 año.
- Tiene ronquera que empeora después de 1 o 2 días.

Cuándo llamar al 911

Llame al 911 para pedir ayuda de urgencia si su hijo tiene:

- Dificultad para respirar, respiración ruidosa o pausas en la respiración.
- Sangrado por la boca o tos con sangre.
- Labios, cara o manos de color azulado.