

Ibuprofeno (Motrin[®], Advil[®]) Ibuprofen (Motrin[®], Advil[®]) (Spanish)

El ibuprofeno pertenece a un grupo de medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Se utiliza para tratar el dolor de leve a moderado, la hinchazón (inflamación) y la fiebre. Las marcas comerciales son Motrin[®], Advil[®], Pediaprofen[®] y Nuprin[®]. Muchas tiendas de comestibles y farmacias tienen sus propias marcas.

El ibuprofeno impide que el cuerpo produzca las sustancias químicas que causan el dolor, la inflamación y la fiebre. Tras administrar una dosis, los síntomas deberían mejorar en 30 a 60 minutos.

Puede conseguir ibuprofeno en forma líquida, comprimidos masticables y comprimidos o cápsulas normales. Viene en diferentes potencias. Las potencias más pequeñas no necesitan receta médica. Las potencias mayores sí necesitan receta médica.

Advertencias

- **NO** dé ibuprofeno a su hijo si es alérgico al ibuprofeno, a la aspirina o a otros AINE.
- Informe al médico o al profesional de atención médica si su hijo tiene antecedentes de enfermedad renal. En algunos casos, estos pacientes deben tomar ibuprofeno a la dosis más baja posible y durante el menor tiempo posible.
- Informe al pediatra si su hijo tiene antecedentes de úlceras o hemorragias estomacales. Estos pacientes deben tomar la dosis más baja posible de ibuprofeno y durante el menor tiempo posible. Dé **siempre** ibuprofeno con comida o leche para proteger el estómago.
- No lo administre a niños menores de 6 meses a menos que se lo indique su médico.
- El ibuprofeno puede causar una erupción cutánea, que puede ser peligrosa. Póngase en contacto con el médico o el profesional de atención médica de su hijo al primer signo de enrojecimiento de la piel.

Cómo administrar

- Líquido - Agite el medicamento antes de usarlo.
 - Asegúrese de que dispone de la jeringa o la taza del tamaño adecuado en función del producto que administre a su hijo. Las jeringas y las tazas para medicamentos pueden venderse por separado en la tienda o pueden estar disponibles detrás del mostrador de la farmacia. (Vea el cuadro de la página 5).
- Comprimidos masticables - Mastique, disuelva en líquido o trague los comprimidos enteros.

QUÉ HACER	QUÉ NO HACER
<ul style="list-style-type: none">– Administre la dosis exacta de medicamento que le haya indicado su médico o profesional de atención médica.– Adminístrelo siempre con alimentos o leche para proteger el estómago.– Permanezca con su hijo hasta que haya ingerido la dosis completa del medicamento.– Utilice un dispositivo de medición pediátrico, como una jeringa dosificadora o una taza para medicamentos, para obtener la dosis exacta.– Lea atentamente la etiqueta y asegúrese de que le está dando a su hijo la cantidad adecuada.	<ul style="list-style-type: none">– No lo administre a bebés menores de 6 meses.– No triture, mastique ni rompa los comprimidos no masticables. Esto provocará efectos secundarios y malestar estomacal.– No lo administre durante más de 3 días sin consultar al médico o al profesional de atención médica.– No mida los medicamentos líquidos con las cucharas con las que come.– No administre medicamentos en la oscuridad. Encienda una luz para ver la cantidad que está dando.

Si el niño vomita una dosis

- Comprimidos, cápsulas y masticables - Si su hijo vomita o escupe toda la pastilla, deje que se calme entre 15 y 30 minutos. Entonces, dele la misma cantidad una vez más.
- Líquido - Si su hijo ingirió este medicamento y luego vomitó, no le dé otra dosis. Una parte del medicamento puede estar todavía en su estómago. Espere hasta que sea la hora de la siguiente dosis.

Posibles efectos secundarios

- Acidez
- Náuseas
- Erupción cutánea
- Cambio en la función renal
- Vómitos.
- Sangrar con facilidad

Si esto ocurre, deje de darle el medicamento y llame al médico de su hijo.

Cuándo llamar al 911

Llame al 911 para pedir ayuda urgente si su hijo presenta alguno de estos signos de reacción alérgica:

- Dificultad para respirar
- Inflamación de la lengua
- Inflamación de manos, pies o tobillos

Cuándo llamar al médico

Llame al médico o al profesional de atención médica de su hijo si presenta alguno de los siguientes síntomas:

- Caca (heces) sanguinolenta o negra alquitranada
- Erupción cutánea grave
- Escupir sangre o material como molido de café
- Fiebre de 103° Fahrenheit (F) o 39.4° Celsius (C) o más
- Presenta fuertes dolores abdominales.
- Moratones o hemorragias inexplicables
- Cualquier efecto secundario que continúe o sea muy molesto.
- Si se toma para la fiebre, ésta no ha desaparecido en 3 días

Interacciones entre medicamentos y alimentos

No tome ibuprofeno con lo siguiente:

- **Alcohol** - puede causar náuseas, vómitos y úlceras de estómago. Esto es muy peligroso.
- **Medicamentos sin receta con ibuprofeno** - Muchos medicamentos sin receta para la tos y el resfriado, las alergias, el dolor y los problemas para dormir contienen ibuprofeno. Si no lo sabe y además le da a su hijo ibuprofeno por separado, podría tomar demasiado. Lea la etiqueta o consulte al médico, al profesional de atención médica o al farmacéutico antes de dar estos productos a su hijo.
- **Aspirina** - No dé ibuprofeno a su hijo si está tomando aspirina. Ambos medicamentos aumentan el riesgo de que su hijo sufra hemorragias y úlceras estomacales.
- **Vitaminas y suplementos** - Pregunte al médico de su hijo si puede dárselos junto con el ibuprofeno.

Almacenamiento del medicamento

- **Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.**
- Conserve el medicamento en el frasco o envase original de la farmacia.
- Mantenga el envase bien cerrado y guárdelo en un lugar oscuro y seco. La luz y la humedad hacen que el medicamento no funcione tan bien.

- No use este medicamento después de la fecha de vencimiento impresa en el envase.
- No guarde este medicamento en el refrigerador. Guárdelo a temperatura ambiente.
- No lo guarde en el baño o encima del fregadero de la cocina.







Medidas de seguridad con los medicamentos

- Este medicamento está recetado para su hijo únicamente. No se lo administre a nadie más.
- **Si su hijo toma demasiado medicamento, o si otra persona toma el medicamento de su hijo, llame primero al Centro de Intoxicaciones de Ohio Central al 1 (800) 222-1222 (TTY 614-228-2272).** Ellos le dirán qué hacer.
- Informe al médico o al profesional de atención médica y al farmacéutico de su hijo si tiene una reacción extraña o alérgica a cualquier medicamento.
- No utilice este medicamento si el envase ha sido abierto.
- Mantenga todos los medicamentos en el frasco a prueba de niños. Manténgalo fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.
- Dígale al profesor de su hijo, al enfermero del colegio, al entrenador, al niñoero y a otras personas que está tomando este medicamento y qué efectos secundarios debe vigilar.
- Pida a su farmacéutico 2 frascos etiquetados si la guardería o la escuela le van a dar este medicamento.
- Lleve todos los medicamentos de su hijo **en los frascos originales** siempre que vaya al médico, a urgencias o le ingresen en el hospital.
- Lleve siempre consigo una lista actualizada de los medicamentos de su hijo. Debe incluir las recetas, los medicamentos sin receta, los productos a base de hierbas y naturales y los suplementos.
- Apréndase el nombre, la forma en que se escribe y la dosis del medicamento. Además, enséñele a su hijo si es lo suficientemente mayor. Necesitará conocer esta información cuando llame al médico o al farmacéutico.
- Mezcle cualquier medicamento sobrante con un material no deseado como posos de café o arena para gatos. Colóquelo en un recipiente o una bolsa que no gotee. Después, tírelo a la basura donde los niños y las mascotas no puedan alcanzarlo. También puede llevar los medicamentos viejos a cualquier farmacia del Nationwide Children's Hospital durante el horario comercial normal de la farmacia.

Dosificación del ibuprofeno LÍQUIDO

IMPORTANTE

- Este medicamento viene en diferentes colores, potencias y formas.
- **Antes de administrarlo, compruebe siempre la dosis.** La dosificación por peso puede ser en libras (lbs) o kilogramos (kg).
- Es posible que tenga que conseguir una jeringa diferente en su farmacia dependiendo de la dosis.

Peso	Edad	Gotas de ibuprofeno para lactantes (50 mg/1.25 ml)	Ibuprofeno líquido para niños (100 mg/5 ml)
<i>* Si es posible, utilice el peso para dosificar; si no, utilice la edad. *</i>			
0 a 11 lbs (hasta 5 kg)	De 0 a 5 meses	NO dé ibuprofeno a niños menores de 6 meses.	
		Utilice la jeringa del envase	Consiga una jeringa de farmacia
12 a 17 lbs (5 a 7 kg)	De 6 a 11 meses	1.25 ml 	2.5 ml 
18 a 23 lbs (8 a 10 kg)	12 a 23 meses	1.875 ml 	4 ml 
24 a 35 lbs (11 a 15 kg)	2 a 3 años		5 ml 
			Utilice la taza del envase
36 a 47 lbs (16 a 21 kg)	4 a 5 años		7.5 ml 
48 a 59 lbs (22 a 26 kg)	6 a 8 años		10 ml 
60 a 71 lbs (27 a 32 kg)	9 a 10 años		12.5 ml 
72 a 87 lbs (33 a 43 kg)	11 años		15 ml 
88 libras o más (40 kg o más)	12 años o más		20 ml (10 ml + 10 ml) 


Dé la vuelta para los comprimidos masticables de ibuprofeno para niños y adultos. →



Dosificación de los COMPRIMIDOS de ibuprofeno

IMPORTANTE

- Este medicamento viene en diferentes colores, potencias y formas.
- **Antes de administrarlo, compruebe siempre la dosis.**
- La dosificación por peso puede ser en libras (lbs) o kilogramos (kg).

Peso	Edad	Comprimidos masticables de ibuprofeno para niños (100 mg)	Comprimidos de ibuprofeno (200 mg)
<i>* Si es posible, utilice el peso para dosificar; si no, utilice la edad. *</i>			
0 a 11 lbs (hasta 5 kg)	De 0 a 5 meses	NO dé ibuprofeno a niños menores de 6 meses.	
12 a 17 lbs (5 a 7 kg)	De 6 a 11 meses	NO administre comprimidos a niños de 6 a 23 meses de edad debido al riesgo de asfixia.	
18 a 23 lbs (8 a 10 kg)	12 a 23 meses		
24 a 35 lbs (11 a 15 kg)	2 a 3 años	1 comprimido 	
36 a 47 lbs (16 a 21 kg)	4 a 5 años	1 ½ comprimidos 	
48 a 59 lbs (22 a 26 kg)	6 a 8 años	2 comprimidos 	1 comprimido 
60 a 71 lbs (27 a 32 kg)	9 a 10 años	2 ½ comprimidos 	1 comprimido 
72 a 87 lbs (33 a 43 kg)	11 años	3 comprimidos 	1 comprimido 
88 libras o más (40 kg o más)	12 años o más	4 comprimidos 	2 comprimidos 