

Aerosol intranasal de midazolam (Nayzilam®)

Intranasal Midazolam (Nayzilam®) Spray (Spanish)

Midazolam es el nombre genérico de Nayzilam®. Este medicamento es una fina niebla que se administra por la nariz y se absorbe rápidamente. Actúa en el cerebro para detener las convulsiones en brotes y prolongadas. **Las convulsiones en brotes** se producen muy seguidas. **Las convulsiones prolongadas** duran más de 5 minutos. Las convulsiones deben detenerse dentro de los 5 minutos posteriores a la administración del medicamento.

Advertencia

Si su hijo es alérgico al midazolam, no le administre este medicamento. Consulte los signos de una reacción alérgica en la página 3 en "Cuándo llamar al 911".

Cómo administrar este medicamento

- No saque el medicamento del envase hasta que lo necesite.
- El midazolam se administra en la nariz (por vía intranasal).
- El dispositivo de pulverización nasal del midazolam tiene una boquilla, asas para los dedos y un émbolo (Imagen 1).




Imagen 1 El dispositivo del medicamento midazolam

- El dispositivo de pulverización nasal solo puede utilizarse una vez. **No lo pruebe ni lo cebe antes de usarlo. Perderá la dosis.**
- Lea la etiqueta con atención. Asegúrese de que está administrando la dosis correcta del medicamento adecuado.
- Permanezca con su hijo hasta que cese la convulsión.
- El midazolam no sustituye a los demás medicamentos de su hijo. **No deje de darle sus otros medicamentos** sin hablar con su médico o profesional de atención de la salud.

Cómo administrar

1. Cuando esté listo para usar, sostenga el envase en la palma de la mano. En el dorso de la lámina de papel aluminio, busque la lengüeta "Despegue aquí" y tire hacia abajo (Figura 1).
2. Retire con cuidado el dispositivo de pulverización nasal.
3. Si su hijo tiene mocos, límpieselos antes de administrarle el medicamento.
4. Sujete el dispositivo de pulverización nasal con el pulgar en el émbolo y los dedos corazón e índice a cada lado de la boquilla (Figura 2). **NO presione hacia abajo.**
5. Mantenga firme la cabeza de su hijo con la mano libre. Coloque la punta de la boquilla en 1 orificio nasal hasta que sus dedos de cada lado de la boquilla toquen la parte inferior de la nariz (Figura 3).
6. Presione firmemente el émbolo para administrar la dosis de aerosol nasal (Figura 4).
7. NO es necesario que la persona respire profundamente cuando le administre el medicamento.
8. Si las instrucciones son colocar un pulverizador en cada orificio nasal, siga las instrucciones anteriores utilizando un **nuevo** pulverizador nasal en el **otro orificio nasal**.

Figura 1



Figura 2





Figura 3



Figura 4



Posibles efectos secundarios

- Somnolencia
- Náuseas
- Irritación nasal
- Dolor de cabeza
- Nariz congestionada
- Cambios en la respiración
- Se altera fácilmente (agitación)
- Mareos

Cuándo llamar al médico

Llame al médico o al profesional de atención de la salud de su hijo si algún efecto secundario continúa o causa problemas. Si tiene alguna duda, asegúrese de preguntar al médico, el enfermero o el farmacéutico.

Cuándo llamar al 911

Quédese y vigile a su hijo después de darle este medicamento.

Llame al 911 si:

- Su hijo tiene algunos de estos signos de reacción alérgica:
 - Dificultad para respirar
 - Inflamación de lengua, manos, pies o tobillos
- Su hijo tiene una convulsión que dura más de 5 minutos después de administrarle midazolam.
- Su hijo tiene convulsiones que son más graves o suceden más que antes.
- El color de su hijo es gris o azul y su respiración es superficial.
- Hay otro problema que le preocupa.
- El médico o el profesional de atención de la salud de su hijo se lo indica.

Almacenamiento y eliminación

- Guarde siempre el medicamento en el envase original de la farmacia.
- No guarde este medicamento en el refrigerador. Guárdelo a temperatura ambiente.
- Si lleva el medicamento en un bolso o cartera, manténgalo fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.
- Tire (deseche) la unidad del spray nasal y el envase después de haberlo utilizado.
- Tire los medicamentos caducados o los que ya no necesite en un contenedor de devolución de medicamentos. Puede encontrarlos en www.rxdrugdropbox.org.