

Acetaminofeno (Tylenol®)

Acetaminophen (Tylenol®) (Spanish)

El acetaminofeno es un medicamento utilizado para reducir la fiebre y tratar el dolor. La marca comercial es Tylenol®. Otros nombres de este medicamento son Tempra® y FEVERALL®. Muchas tiendas de comestibles y farmacias tienen sus propias marcas. Tras administrar una dosis, los síntomas deberían mejorar en 30 a 60 minutos.

Puede obtener el acetaminofeno en forma líquida, comprimidos masticables, sobres disolubles, comprimidos o cápsulas normales y supositorios. Viene en diferentes concentraciones y no necesita receta médica.

Cómo administrar

- Líquido - Agite el medicamento antes de usarlo.
- Comprimidos masticables - Mastique, disuelva en líquido o trague los comprimidos enteros.
- Sobres disolubles - Rompa el sobre y vierta el polvo en la lengua de su hijo.
- Supositorios - Humedézcalos con agua o Vaseline® antes de introducirlos en el trasero (recto) de su hijo. Se utilizan sobre todo cuando un niño no puede tomar medicamentos por vía oral. Pida más información al médico, al profesional de atención médica o al farmacéutico de su hijo.

QUÉ HACER	QUÉ NO HACER
<ul style="list-style-type: none"> – Administre la dosis exacta de medicamento que le haya indicado su médico o profesional de atención médica. – Pregunte al médico, al profesional de atención médica o al farmacéutico antes de triturar cualquier medicamento. 	<ul style="list-style-type: none"> – No lo administre durante más de 3 días sin consultar al médico o al profesional de atención médica. – No administre más de 5 dosis de este medicamento en 24 horas a menos que el médico o el profesional de atención médica lo autorice.

- Permanezca con su hijo hasta que haya ingerido la dosis completa del medicamento.
- Utilice un dispositivo de medición pediátrico, como una jeringa dosificadora o una taza para medicamentos.
- Lea atentamente la etiqueta y asegúrese de que le está dando a su hijo la cantidad adecuada.

- No mida los medicamentos líquidos con las cucharas con las que come.
- No administre medicamentos en la oscuridad. Encienda siempre una luz para ver la cantidad que está dando.

Advertencias

- No dé a su hijo más de 4 gramos (g) [4,000 miligramos (mg)] en 24 horas.
- Informe al médico, al profesional de atención médica o al farmacéutico de su hijo si:
 - Es alérgico al acetaminofeno.
 - Padece una enfermedad llamada deficiencia de G6PD.
 - Padece una enfermedad hepática o renal.
 - Padece una enfermedad llamada fenilcetonuria (PKU).

Si el niño vomita una dosis

- Comprimidos, cápsulas y masticables - si su hijo vomita o escupe toda la pastilla, deje que se calme entre 15 y 30 minutos. Entonces, dele la misma cantidad una vez más.
- Líquido o polvo disuelto en una bebida - si su hijo ingirió este medicamento y luego vomitó, no repita la dosis. Una parte del medicamento puede estar todavía en su estómago. Espere hasta que sea la hora de la siguiente dosis.

Posibles efectos secundarios

Los efectos secundarios son poco frecuentes, pero pueden incluir erupciones cutáneas o hematomas.

Si aparecen efectos secundarios, deje de darle el medicamento y llame al médico o al profesional de atención médica de su hijo (consulte la sección siguiente).

Cuándo llamar al médico

Llame al médico o al profesional de atención médica de su hijo si presenta alguno de los siguientes síntomas:

- Fiebre de 103° Fahrenheit (F) o 39.4° Celsius (C) o más
- La fiebre dura más de 3 días
- Le sale una nueva erupción cutánea
- Signos de daño hepático:
 - Orina (pis) oscura
 - Caca de color claro
 - Se producen moretones con facilidad.
 - Náuseas y vómitos
- La fiebre sube después de administrar el medicamento
- El dolor no mejora o desaparece después de tomar este medicamento
- No se ve bien
 - Sangra con facilidad
 - La piel o el blanco de los ojos se vuelven amarillos
 - Dolor de vientre en el lado derecho

Cuándo llamar al 911

Llame al 911 para obtener ayuda de emergencia si su hijo presenta cualquiera de los siguientes síntomas **después de** tomar un medicamento:

- Dificultad para respirar
- Inflamación de la lengua
- Inflamación de manos, pies o tobillos

Interacciones entre medicamentos y alimentos

Su hijo **no** debe tomar acetaminofeno con lo siguiente:

- **Alcohol** - puede causar daños en el hígado si se toma con acetaminofeno.
- **Algunos medicamentos con receta** - pueden causar daños en el hígado cuando se toman con acetaminofeno. Informe siempre al médico, farmacéutico o profesional de atención médica si su hijo está tomando otros medicamentos. Algunos medicamentos que su hijo no debe tomar con acetaminofeno incluyen:
 - Lamotrigina (Lamictal®)
 - Fenitoína (Dilantin®)
 - Warfarina (Coumadin®)
 - Carbamazepina (Tegretol®)
 - Isoniazida (INH)
- **Analgésicos recetados con acetaminofeno** - Algunos analgésicos contienen acetaminofeno. Tomar estos analgésicos al mismo tiempo que el acetaminofeno normal

puede provocar una sobredosis de acetaminofeno en su hijo. Algunos ejemplos de estos analgésicos son:

- Acetaminofeno con codeína (Tylenol® con codeína)
- Hidrocodona con acetaminofeno (Vicodin®, Lortab®, Norco®)
- Oxycodona con acetaminofeno (Percocet®)
- **Medicamentos de venta libre con acetaminofeno** - Muchos medicamentos de venta libre para la tos y el resfriado, las alergias, el dolor y los problemas para dormir contienen acetaminofeno. Tomar estos medicamentos al mismo tiempo que el acetaminofeno normal puede provocar en su hijo una sobredosis de acetaminofeno. Lea la etiqueta o consulte al médico, al profesional de atención médica o al farmacéutico antes de dar estos productos a su hijo.
- **Vitaminas y suplementos** - Pregunte al médico de su hijo si está bien dárselos con acetaminofeno.

Almacenamiento del medicamento

- **Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.**
- Conserve el medicamento en el frasco o envase original de la farmacia.
- Mantenga este medicamento alejado del calor y de la luz solar directa.
- No use este medicamento después de la fecha de vencimiento impresa en el envase.

Líquido, comprimido o cápsula	Supositorio
<ul style="list-style-type: none"> – Mantenga el envase bien cerrado y guárdelo en un lugar oscuro y seco. La luz y la humedad hacen que el medicamento no funcione tan bien. – No guarde este medicamento en el refrigerador. Almacénelo a temperatura ambiente. – No lo guarde en el baño o encima del fregadero de la cocina. 	<ul style="list-style-type: none"> – Guarde los supositorios en un lugar fresco y oscuro. Pueden fundirse si se almacenan con un calor excesivo. – Los supositorios pueden guardarse en el frigorífico.







Medidas de seguridad con los medicamentos

- Este medicamento está recetado para su hijo únicamente. No se lo administre a nadie más.
- **Si su hijo toma demasiado medicamento, o si otra persona toma el medicamento de su hijo, llame primero al Centro de Intoxicaciones de Ohio Central al 1 (800) 222-1222 [TTY (614) 228-2272]. Ellos le dirán qué hacer.**
- Informe al médico o al profesional de atención médica y al farmacéutico de su hijo si tiene una reacción extraña o alérgica a cualquier medicamento.
- No utilice este medicamento si el envase ha sido abierto.
- Mantenga todos los medicamentos en el frasco a prueba de niños. Manténgalo fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.
- Dígale al profesor de su hijo, al enfermero del colegio, al entrenador, al niñero y a otras personas que está tomando este medicamento y qué efectos secundarios debe vigilar.
- Pida a su farmacéutico 2 frascos etiquetados si la guardería o la escuela le van a dar este medicamento.
- Lleve todos los medicamentos de su hijo **en los frascos originales** siempre que vaya al médico, a urgencias o le ingresen en el hospital.
- Lleve siempre consigo una lista actualizada de los medicamentos de su hijo. Debe incluir las recetas, los medicamentos sin receta, los productos a base de hierbas y naturales y los suplementos.
- Aprenda el nombre, la forma en que se escribe y la dosis de los medicamentos. Además, enséñele a su hijo si es lo suficientemente mayor. Necesitará conocer esta información cuando llame al médico o al farmacéutico.
- Mezcle cualquier medicamento sobrante con un material no deseado como posos de café o arena para gatos. Colóquelo en un recipiente o una bolsa que no gotee. Después, tírelo a la basura donde los niños y las mascotas no puedan alcanzarlo. También puede llevar los medicamentos viejos a cualquier farmacia del Nationwide Children's Hospital durante el horario comercial normal de la farmacia.

Dosificación del acetaminofeno LÍQUIDO

IMPORTANTE

- Este medicamento viene en diferentes colores, potencias y formas.
- **Compruebe siempre la dosis antes de administrarlo.** La dosificación por peso puede ser en libras (lbs) o kilogramos (kg).
- Es posible que tenga que conseguir una jeringa diferente en su farmacia dependiendo de la dosis.


Peso	Edad	Acetaminofeno líquido para lactantes o niños (160 mg/5 ml)	Sobres disolubles de acetaminofeno para niños (160 mg/1 sobre)
<i>* Si es posible, utilice el peso para dosificar; si no, utilice la edad. *</i>			
6 a 11 lbs (3 a 5 kg)	0 a 3 meses	1.25 ml 	
12 a 17 lbs (5 a 7 kg)	4 a 11 meses	2.5 ml 	
18 a 23 lbs (8 a 10 kg)	12 a 23 meses	3.75 ml 	
24 a 35 lbs (11 a 15 kg)	2 a 3 años	5 ml 	
36 a 47 lbs (16 a 21 kg)	4 a 5 años	7.5 ml 	
48 a 59 lbs (22 a 26 kg)	6 a 8 años	10 ml 	2 sobres 
60 a 71 lbs (27 a 32 kg)	9 a 10 años	12.5 ml 	2 sobres 
72 a 95 lbs (33 a 43 kg)	11 años	15 ml 	3 sobres 
96 lbs a 142 lbs (44 a 64 kg)	12 años o más	20 ml (10 ml + 10 ml) 	

Dé la vuelta para ver el acetaminofeno masticable para niños, de potencia normal y de potencia extra. 

Dosificación del acetaminofeno en COMPRIMIDOS

IMPORTANTE

- Este medicamento viene en diferentes colores, potencias y formas.
- **Compruebe siempre la dosis antes de administrarlo.** La dosificación por peso puede ser en kilogramos (kg) o libras (lbs).

Peso	Edad	Acetaminofeno masticable para niños (160 mg)	Comprimidos de acetaminofeno de potencia normal (325 mg)	Comprimidos de acetaminofeno de potencia extra (500 mg)
* Si es posible, utilice el peso para dosificar; si no, utilice la edad. *				
6 a 11 lbs (3 a 5 kg)	0 a 3 meses	NO administre comprimidos a niños de 0 a 23 meses de edad debido al riesgo de asfixia.		
12 a 17 lbs (5 a 7 kg)	4 a 11 meses			
18 a 23 lbs (8 a 10 kg)	12 a 23 meses			
24 a 35 lbs (11 a 15 kg)	2 a 3 años	1 comprimido 		
36 a 47 lbs (16 a 21 kg)	4 a 5 años	1 ½ comprimidos 		
48 a 59 lbs (22 a 26 kg)	6 a 8 años	2 comprimidos 	1 comprimido 	
60 a 71 lbs (27 a 32 kg)	9 a 10 años	2 ½ comprimidos 	1 comprimido 	
72 a 95 lbs (33 a 43 kg)	11 años	3 comprimidos 	1 ½ comprimidos 	1 comprimido 
96 lbs a 142 lbs (44 a 64 kg)	12 años o más	4 comprimidos 	2 comprimidos 	1 comprimido 
143 lbs o más (65 kg o más)				3 comprimidos 